

Verhalten nach chirurgischen Eingriffen:

- Erst essen, wenn die Betäubung nachlässt (Bissverletzung)
- Den Mund nicht stark ausspülen
- Nicht rauchen
- keinen Alkohol, Kaffee, Schwarztee, Energy Drink etc.
- keine sportlichen Betätigungen in den ersten Tagen
- 2 Tage regelmässig kühlen (maximal 10 Minuten, anschliessend 30 Minuten Pause)
- Normale Mundpflege betreiben, Vorsicht im Wundgebiet

Mögliche Begleiterscheinungen:

- Schwellung (Maximum am zweiten Tag nach dem Eingriff)
- Eingeschränkte Mundöffnung
- Hämatome (Blaue Flecken)
- Nachblutungen (20 Minuten fest auf einen Tupfer oder Stofftaschentuch beißen)

Medikamente: (Kinder/Jugendliche: Dosis dem Körpergewicht anpassen)

- Gegen Schmerzen: Ibuprofen/Algifor 400mg nach Bedarf, maximal 3 pro Tag
- Desinfektion: Chlorhexamed Mundspülung, 2x täglich 30 Sekunden leicht spülen
- Antibiotika: Co-Amoxi-Mepha 1g, 2x Täglich je 1 Tablette

(Bei Penicillinallergie: Dalacin 300, 3x Täglich je 1 Tablette)

So lange einnehmen, wie vereinbart, auch wenn die Beschwerden früher nachlassen

In dringenden Fällen sind wir für Sie da:

041 210 20 05

Gute Besserung!

■ Zahnärzte SSO

Dr. med. dent.
Felix Brunner-Wildisen
Eidg. dipl. Zahnarzt
Diplomate ICOI

Dr. med. dent.
Bianca Brunner-Wildisen
Eidg. dipl. Zahnärztin

Dr. med. dent.
Miranda Brunner-Kurmann
Eidg. dipl. Zahnärztin

Dr. med. dent.
Flavio Brunner-Kurmann
Eidg. dipl. Zahnarzt
Fachzahnarzt für Oralchirurgie (SSOS)
Spezialist für Prothetik (DGPro)